






# Plan d'hygiène pour EMS

	Produit	Comme	Quand												
<b>Mains</b>															
	<b>Softa-Man® pure</b> désinfectant des mains avec la pro-vitamine B5, allantoiné et bisabolol soignants (exempt de parfums et de colorants)	pour la désinfection hygiénique des mains incl. norovirus : frotter les mains avec <b>3 ml</b> pendant <b>15 s.</b> au moins jusqu'à leur séchage. Pour que toutes les parties de la main soient bien désinfectées : <b>observer EN 1500 !</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>avant et après chaque soin aux patients</li> <li>avant une tâche propre / invasive</li> <li>après les liquides organiques / gants</li> </ul>												
	<b>Softaskin®</b> lotion de lavage douce pour la peau et les mains sensibles	laver les mains à l'eau tiède, rincer et bien sécher avec une serviette à usage unique	<ul style="list-style-type: none"> <li>au début et à la fin du travail</li> <li>avant et après chaque pause</li> <li>après être allé aux toilettes</li> <li>en cas de salissures visibles</li> </ul>												
	<b>Trixo®-lind</b> lotion de soin pour la peau et les mains	enduire consciencieusement la lotion de soin	<ul style="list-style-type: none"> <li>au début et à la fin du travail</li> <li>avant et après chaque pause</li> <li>en tout temps / selon besoin</li> </ul>												
<b>Peau</b>															
	<b>Braunol®</b> solution d'iode-PVP désinfectant de la peau, antiseptique pour plaies et muqueuses	enduire Braunol® non dilué sur la partie de peau à désinfecter et laisser sécher. Temps d'action avant les injections et ponctions : <b>au moins 15 s.</b> Veuillez prendre note de l'information sur le médicament / <a href="http://www.swissmedicinfo.ch">www.swissmedicinfo.ch</a>	désinfectant de la peau avant les injections, ponctions des articulations, cavités corporelles et organes creux, ainsi que les interventions opératoires												
	<b>Softasept® N</b> lotion alcoolique prête à l'emploi, désinfectant de la peau	enduire Softasept® N non dilué sur la partie de peau à désinfecter et laisser sécher. Temps d'action avant les injections et ponctions : <b>au moins 15 s.</b> Veuillez prendre note de l'information sur le médicament / <a href="http://www.swissmedicinfo.ch">www.swissmedicinfo.ch</a>	désinfectant de la peau avant les injections, ponctions des articulations, cavités corporelles et organes creux, ainsi que les interventions opératoires												
<b>Petites surfaces</b>															
	<b>Meliseptol® rapid</b> désinfectant rapide prêt à l'emploi	nettoyer avec un chiffon à usage unique imbibé de Meliseptol® rapid le matériel ou la petite surface et les maintenir humides pendant le temps d'action. Temps d'action : <b>1 min., norovirus : 1 min. Porter des gants !</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>selon besoin</li> <li><b>enlever d'abord les grosses salissures !</b></li> </ul>												
	<b>Meliseptol® HBV-lin-gettes</b> désinfectant rapide prêt à l'emploi sous forme de lingettes	nettoyer avec Meliseptol® HBV – lingettes, et les maintenir humides pendant le temps d'action. Temps d'action : <b>1 min., norovirus : 1 min. Porter des gants !</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>selon besoin</li> <li><b>enlever d'abord les grosses salissures !</b></li> </ul>												
	<b>Meliseptol® Foam pure</b> désinfectant prêt à l'emploi pour matières sensibles	mouiller l'objet ou des petites surfaces avec Meliseptol® Foam pure, appliquer avec un chiffon à usage unique et laisser humide pendant le temps d'action. Temps d'action : <b>1 min., norovirus : 5 min. Porter des gants !</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>selon besoin : pour surfaces sensibles telles que le verre acrylique, les claviers, le similicuir et les sondes</li> <li><b>enlever d'abord les grosses salissures !</b></li> </ul>												
	<b>Meliseptol® Wipes sensitive</b> désinfectant prêt à l'emploi pour matières sensibles sous forme de lingettes	humidifier le matériel ou la petite surface avec Meliseptol® Wipes sensitive et laisser humide pendant le temps d'action. Temps d'action : <b>1 min., norovirus : 5 min. Porter des gants !</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>selon besoin : pour surfaces sensibles telles que le verre acrylique, les claviers, le similicuir et les sondes</li> <li><b>enlever d'abord les grosses salissures !</b></li> </ul>												
<b>Grandes surfaces</b>															
	<b>Hexaquart® XL</b> Concentré exempt d'aldéhydes pour désinfection et nettoyage du mobilier et des sols	Asperger complètement les sols avec la <b>solution à 0.5 %</b> puis laisser sécher. Temps d'action : <b>30 min.</b> ou <b>solution à 3%. 15 min.</b> <b>Norovirus : solution à 2 %. 60 min.</b> <b>Porter des gants !</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Concentré</th> <th>Solution</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>10 ml = 1 l</td> <td></td> </tr> <tr> <td>20 ml = 2 l</td> <td></td> </tr> <tr> <td>40 ml = 4 l</td> <td></td> </tr> <tr> <td>60 ml = 6 l</td> <td></td> </tr> <tr> <td>80 ml = 8 l</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <ul style="list-style-type: none"> <li>après chaque utilisation.</li> <li><b>enlever d'abord les grosses salissures !</b></li> </ul>	Concentré	Solution	10 ml = 1 l		20 ml = 2 l		40 ml = 4 l		60 ml = 6 l		80 ml = 8 l	
Concentré	Solution														
10 ml = 1 l															
20 ml = 2 l															
40 ml = 4 l															
60 ml = 6 l															
80 ml = 8 l															
<b>Instruments</b>															
	<b>Stabimed® fresh</b> désinfectant pour instruments, exempt d'aldéhydes	tremper les instruments complètement pendant <b>15 min.</b> dans une <b>solution à 0.5 %</b> ou <b>5 min.</b> dans une <b>solution à 1%</b> , rincer à l'eau courante pour terminer. <b>Porter des gants, des vêtements de protection et une protectin des yeux / du visage !</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Concentré</th> <th>Solution</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>5 ml = 1 l</td> <td></td> </tr> <tr> <td>20 ml = 4 l</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Concentré</th> <th>Solution</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>10 ml = 1 l</td> <td></td> </tr> <tr> <td>40 ml = 4 l</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <ul style="list-style-type: none"> <li>tremper les instruments immédiatement après emploi. Veiller à un trempage complet</li> </ul>	Concentré	Solution	5 ml = 1 l		20 ml = 4 l		Concentré	Solution	10 ml = 1 l		40 ml = 4 l	
Concentré	Solution														
5 ml = 1 l															
20 ml = 4 l															
Concentré	Solution														
10 ml = 1 l															
40 ml = 4 l															