



SOLUZIONE  
PRONTA ALL'USO



Disponibile quale variante  
colorata e incolore

## Clorexidina 2.0% alcolica

SOLUZIONE ALCOLICA PER LA DISINFEZIONE

# Clorexidina 2.0% alcolica

## SOLUZIONE ALCOLICA PER LA DISINFEZIONE

### USO

Per la disinfezione rapida della parte di cute da trattare.



Perizia	Risultato
Disinfezione della cute T. Kohburger Hygiene Nord GmbH, Greifswald, 25.02.2011	Conforme alla raccomandazione DGHM (2001/2002) Cute povera di ghiandole sebacee (parte superiore del braccio): tempo di azione 15 sec. Cute ricca di ghiandole sebacee (fronte): tempo d'azione 2.5 min.
Disinfezione della cute T. Kohburger Hygiene Nord GmbH, Greifswald, 08.03.2011 (Zusatz zu 25.02.2011)	Conforme alla raccomandazione DGHM (2001/2002) Cute ricca di ghiandole sebacee (fronte): tempo d'azione 2 min.
Disinfezione delle mani a norma EN 1500	Clorexidina tintura al 2% soddisfa i requisiti della norma di EN 1500 sulla disinfezione igienica delle mani 3 ml, tempo d'azione: 30 sec.
Battericidia	Conforme a EN 13727 Ceppi di riferimento <i>E. coli</i> , <i>P. aeruginosa</i> , <i>E. hirae</i> e <i>S.aureus</i> Tempo d'azione: 15 sec.
Fungicidia (saccaromiceti)	Conforme a EN 13624 Ceppo di riferimento <i>C. albicans</i> Tempo d'azione: 15 sec.
Confronto dell'efficacia prodotto colorato/incolore	Efficacia paragonabile dei due prodotti rispetto ai ceppi di riferimento <i>P. aeruginosa</i> e <i>C. albicans</i> (EN 13727 e EN 13624). Sotto carico entrambe le formulazioni dimostrano azione battericida e fungicida (saccaromiceti) in 15 sec.

Articolo	Cod. art.	Pharmacode	Articolo	Cod. art.	Pharmacode
<b>Clorexidina tintura 2% incolore</b>			<b>Clorexidina tintura 2% colorata</b>		
Flacone ovale 100 ml	19533	5077160	Flacone ovale 100 ml	19531	5077148
Flacone rotondo 250 ml	19552	5077177	Flacone spray 250 ml	19966	7313127
Flacone spray 250 ml	19965	7313110	Flacone ovale 500 ml	19532	5077154
Flacone ovale 500 ml	19534	5077183			

### COMPOSIZIONE

Chlorhexidini digluconas 20 mg, Alcohol isopropylicus 0.7 ml, Excipients, Aqua q.s. ad solutionem pro 1 ml (versione colorata anche colorante E122).

### INDICAZIONI SPECIALI

Utilizzare il disinfettante con attenzione.  
Prima dell'utilizzo leggere l'etichettatura e la scheda informativa del prodotto.

B. Braun Medical SA | Hospital & Out Patient Market | Seesatz 17 | 6204 Sempach | www.bbraun.ch  
Hospital Market: Tel. 0848 83 00 44 | Fax 0800 83 00 43 | sales-hospital.bbmch@bbraun.com  
Out Patient Market: Tel. 0848 83 00 33 | Fax 0800 83 00 32 | sales-opm.bbmch@bbraun.com